

動物用医薬品

2018年4月改訂

貯法 室温保存

サルファ剤

要指示医薬品 指定医薬品 使用基準

承認指令書番号	14 生畜第 1802 号
販売開始	1982 年 2 月

サルトキシム末

【成分及び分量】

有効成分	含量 100g 中
スルファジメトキシナトリウム	10g

【効能又は効果】

豚：トキソプラズマ病
鶏：コクシジウム病、伝染性コリーザ、ロイコチトゾーン病

【用法及び用量】

〔飼料添加〕

飼料 1kg 当たりスルファジメトキシナトリウムとして下記の量を均一に混ぜて経口投与する。

豚：700～2,000mg（本剤として 7～20g）

鶏（産卵鶏を除く）

コクシジウム病、伝染性コリーザ：500～1,000mg
（本剤として 5～10g）

ロイコチトゾーン病：25～100mg（本剤として 0.25～1g）

〔飲水添加〕

1 日体重 1kg 当たりスルファジメトキシナトリウムとして下記の量を飲水に均一に溶かして経口投与する。

豚：50～100mg（本剤として 0.5～1g）

飲水 1L 当たりスルファジメトキシナトリウムとして下記の量を均一に溶かして経口投与する。

鶏（産卵鶏を除く）

コクシジウム病、伝染性コリーザ：500mg（本剤として 5g）

【使用上の注意】

（基本的事項）

1. 守らなければならないこと

（一般的注意）

- ・本剤は要指示医薬品であるので獣医師等の処方箋・指示により使用すること。
- ・本剤は効能・効果において定められた適応症の治療のみ使用すること。
- ・本剤は定められた用法・用量を厳守すること。
- ・本剤の使用に当たっては、治療上必要な最小限の期間の投与に止めることとし、過剰にわたる連続投与は行わないこと。
- ・本剤をロイコチトゾーン病に使用する場合は、使用法の細部にわたって獣医師の指導を受けること。
- ・本剤は「使用基準」の定めるところにより使用すること。

注意：本剤は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第 83 条の 4 の規定に基づき上記の用法及び用量を含めて使用者が遵守すべき基準が定められた動物用医薬品ですので、使用対象動物（豚、鶏：産卵鶏を除く）について上記の用法及び用量並びに次の使用禁止期間を遵守してください。

〔飼料添加〕豚、鶏（産卵鶏を除く）

：食用に供するために殺する前 14 日間

〔飲水添加〕豚：食用に供するために殺する前 10 日間

鶏（産卵鶏を除く）

：食用に供するために殺する前 14 日間

（使用者に対する注意）

- ・本剤を使用する際は、防護メガネ、マスク、手袋、作業着等を着用し、粉じん等の吸引、眼や皮膚に付着しないように注意すること。

（取扱い及び廃棄のための注意）

- ・本剤は、小児の手の届かない所に保管すること。
- ・使用期限の過ぎたものは使用しないこと。
- ・本剤は、直射日光、高温及び多湿を避けて保管すること。
- ・誤用を避け、品質を保持するため、本剤を他の容器に入れ替えないこと。
- ・使用済みの空容器等は地方公共団体の条例等に従い適切に処分すること。
- ・本剤を廃棄する際には、環境や水系を汚染しないように注意し、地方公共団体の条例等に従い適切に処分すること。

2. 使用に際して気を付けること

（使用者に対する注意）

- ・誤って本剤を飲みこんだ場合は、直ちに医師の診察を受けること。
- ・本剤の使用後、または本剤が使用者の皮膚に付着したときは、石けん等でよく洗い、水で十分うがいすること。

（豚及び鶏に関する注意）

- ・副作用が認められた場合には、獣医師の診察を受けること。

【包装】

1kg、5kg、10kg、50kg（100g 又は 1kg 分包）

【使用期限】

36 カ月

【製品情報お問い合わせ先】

リケンベッツファーマ株式会社
〒332-0011 埼玉県川口市元郷 4-1-8
TEL：048-224-8451 FAX：048-224-1079
E-mail：riken@r-vets.jp

製造販売業者



リケンベッツファーマ株式会社

埼玉県川口市元郷 4-1-8

獣医師、薬剤師等の医薬関係者は、本剤による副作用などによると疑われる疾病、障害若しくは死亡の発生又は本剤の使用によるものと疑われる感染症の発生に関する事項を知った場合において、保健衛生上の危害の発生又は拡大を防止するため必要があると認めるときは、上記【製品情報お問い合わせ先】に連絡するとともに、農林水産省動物医薬品検査所（<http://www.maff.go.jp/nval/iyakutou/fukusayo/sousa/index.html>）にも報告をお願いします。