

2024年7月改訂（第4版）

2023年6月改訂（第3版）

動物用医薬品

犬用セフェム系抗菌剤

要指示医薬品 指定医薬品

テリオス錠[®]75mg
テリオス錠[®]300mg

	テリオス錠75mg	テリオス錠300mg
承認指令番号	30動薬第285号	30動薬第286号
販売開始	2020年2月	

® 登録商標

【本質の説明又は製造方法】

テリオス錠（以下、本剤という）はセフェム系抗生物質のセファレキシンを有効成分とする抗生物質製剤である。ブドウ球菌に対して優れた抗菌活性を示し、細菌性皮膚感染症に有効である。嗜好性を高める目的で、豚肝臓粉末（テリオス錠75mg）及びビスケットフレーバー（テリオス錠300mg）を添加している。

【成分及び分量】

品 名	テリオス錠75mg	テリオス錠300mg
有効成分	セファレキシン	
含量（1錠中）	75mg（力価）	300mg（力価）

【効能又は効果】

有効菌種：本剤感受性のブドウ球菌

適応症：犬：細菌性皮膚感染症

【用法及び用量】

1回体重1kgあたりセファレキシンとして15mg（力価）を1日2回7日間経口投与する。ただし、2回の投与間隔は最低10時間とする。

【使用上の注意】

（基本的事項）

1. 守らなければならないこと

（一般的注意）

- 本剤は、要指示医薬品であるので獣医師等の処方箋・指示により使用すること。
- 本剤は、効能・効果において定められた目的のみ使用すること。
- 本剤は、定められた用法・用量を厳守すること。なお、用法・用量に定められた期間以内の投与であってもそれを反復する投与は避けること。
- 本剤の使用にあたっては、適応症の治療上必要な最小限の期間の投与に止めること。

（使用者に対する注意）

- 本剤の成分又はセフェム系抗生物質ならびにペニシリン系抗生物質に対する過敏症を有する人は本剤を取り扱わないこと。

（取扱い及び廃棄のための注意）

- 小児の手の届かないところに保管すること。
- 使用済みの空容器は、地方公共団体条例等に従い処分すること。
- 本剤を廃棄する際は、環境や水系を汚染しないように注意し、地方公共団体条例等に従い処分すること。

2. 使用に際して気を付けること

（使用者に対する注意）

- 本剤を取り扱った際、皮膚の発赤などの過敏症の症状が現れたときは、医師の診察を受けること。
- 誤って薬剤を飲み込んだ場合は、直ちに医師の診察を受けること。

（犬に関する注意）

- 副作用が認められた場合には、速やかに獣医師の診察を受けること。

（専門的事項）

1. 対象動物の使用制限等

- 本剤の成分又はセフェム系抗生物質ならびにペニシリン系抗生物質に対する過敏症を有する犬には投与しないこと。
- 腎機能に高度な障害がある場合には本剤の体内残留時間が長くなる可能性があるため、投与間隔をあけて使用するなど慎重に投与すること。

2. 副作用

- 本剤の投与により、一過性の嘔吐、食欲不振、下痢、軟便がみられることがある。

3. その他の注意

- 尿糖検査では偽陽性を呈することがあるので注意すること。

【薬理学的情報等】

（薬効薬理）

セファレキシンは、細菌の細胞壁合成阻害により殺菌作用を示し、グラム陽性菌及びグラム陰性菌に対して、広い抗菌スペクトルを有する。

【包装】

テリオス錠75mg	200錠（10錠×20シート）PTP 10錠（10錠×1シート）PTP
テリオス錠300mg	100錠（10錠×10シート）PTP 10錠（10錠×1シート）PTP

【製品情報お問い合わせ先】

物産アニマルヘルス株式会社

〒541-0053 大阪市中央区本町2-5-7

<https://www.bussan-ah.com>

製造販売元（輸入発売元）

物産アニマルヘルス株式会社

大阪市中央区本町2-5-7

製造元

Ceva Santé Animale

10 Avenue de la Ballastière

33500 Libourne - France

獣医師、薬剤師等の医薬関係者は、本剤による副作用などによると疑われる疾病、障害若しくは死亡の発生又は本剤の使用によるものと疑われる感染症の発生に関する事項を知った場合において、保健衛生上の危害の発生又は拡大を防止するため必要があると認めるときは、上記【製品情報お問い合わせ先】に連絡するとともに、農林水産省動物医薬品検査所 (<https://www.maff.go.jp/nval/iyakutou/fukusayo/sousa/index.html>) にも報告をお願いします。