2026年7月改訂

貯法	2～8℃

動物用医薬品

動物用生物学的製剤　犬用

劇薬　要指示医薬品　指定医薬品

承認指令書番号
7動薬第599号
販売開始
2025年1月

Virbac

犬用ビルバゲン®DA2PPi

Virbagen®DA2PPi

ジステンパー・犬アデノウイルス（2型）感染症・犬パラインフルエンザ・犬パルボウイルス感染症混合生ワクチン（シード）

【本質の説明又は製造方法】

本剤は、弱毒ジステンパーウイルス、弱毒犬アデノウイルス2型、弱毒犬パラインフルエンザウイルス及び弱毒犬パルボウイルスを、それぞれ培養細胞で増殖させて得たウイルス液を混合し、凍結乾燥した乾燥生ワクチンである。

乾燥ワクチンは帯黄灰白色ないしは灰白色の乾燥物で、添付の溶解用液を加えて振盪すると容易に溶解し、わずかな淡橙色のほぼ透明の均質な液体となる。

溶解用液は、注射用水で、無色透明な液体である。

【成分及び分量】

乾燥ワクチン1バイアル（1頭分）中

主　剤　Vero 細胞培養弱毒ジステンパーウイルス
　レダリー株　VR128（シード）……$10^{3.0}$ $TCID_{50}$ 以上

主　剤　MDCK 細胞培養弱毒犬アデノウイルス2型
　マンハッタン　A_2株（シード）……$10^{3.3}$ $TCID_{50}$ 以上

主　剤　Vero 細胞培養弱毒犬パラインフルエンザウイルス
　マンハッタン株（シード）……$10^{5.5}$ $TCID_{50}$ 以上

主　剤　CCL64 細胞培養弱毒犬パルボウイルス
　コーネル株CPV115 780916（シード）……$10^{4.0}$ $TCID_{50}$ 以上

安定剤　水酸化カリウム……0.46 mg

安定剤　乳糖……126 mg

安定剤　L-グルタミン酸……1.21 mg

安定剤　リン酸二水素カリウム……0.64 mg

安定剤　リン酸二カリウム……2.4 mg

安定剤　ゼラチン……7.5 mg

溶解用液1バイアル（1mL）中

注射用水……1.0 mL

【効能又は効果】

犬のジステンパー、犬伝染性肝炎、犬アデノウイルス2型感染症、犬パルボウイルス感染症及び犬パラインフルエンザウイルス感染症の予防。

【用法及び用量】

乾燥ワクチンに添付の溶解用液を加えて溶解し、8週齢以上の健康な犬の皮下に全量を注射し、さらに3～4 週間後に同様に注射する。

【使用上の注意】

「基本的事項」

1.守らなければならないこと

（一般的注意）

●本剤は、要指示医薬品であるので獣医師の処方箋・指示により使用すること。

●本剤は、効能・効果において定められた目的にのみ使用すること。

●本剤は、定められた用法・用量を厳守すること。

（取扱い及び廃棄のための注意）

●外観又は内容に異常を認めたものは使用しないこと。●使用期限が過ぎたものは使用しないこと。●本剤には他の薬剤を加えて使用しないこと。●小児の手の届かないところに保管すること。●直射日光、高温及び凍結は品質に影響を与えるので、避けること。●使い残りのワクチン及び使用済みの容器は、消毒又は滅菌後に地方公共団体条例等に従い処分、若しくは感染性廃棄物として処分すること。●使用済みの注射針は、針回収用の専用容器に入れること。針回収用の容器の廃棄は、産業廃棄物収集運搬業及び産業廃棄物処分業の許可を有した業者に委託すること。

2.使用に際して気を付けること

（使用者に対する注意）

●誤って人に注射した場合には、患部の消毒等適切な処置をとること。必要があれば本使用説明書を持参し、受傷について医師の診察を受けること。

本ワクチンの成分の特徴

	抗原		アジュバント	
微生物名	人獣共通感染症の当否	微生物の生死	有無	種類
ジステンパーウイルス	否	生	無	
犬アデノウイルス2型	否	生		
犬パラインフルエンザウイルス	否	生		
犬パルボウイルス	否	生		

84361402

本ワクチンのウイルス株はいずれも人に対する病原性がない。

●開封時にアルミキャップの切断面で手指を切るおそれがあるので注意すること。●乾燥ワクチン瓶内は真空になっており、破裂する危険性があるので、強い衝撃を与えないこと。

(犬に関する注意)

●注射後2～3日間は安静につとめ、激しい運動、交配、入浴又はシャンプー等は避けること。

●副反応が認められた場合には、速やかに獣医師の診察を受けること。

●注射後免疫を獲得するまでに3～4週間を要するので、この間は病気をもっていると思われる犬との接触は避けること。

「専門的事項」

1.警告

本剤の注射前には犬の健康状態について検査し、次の場合には接種しないこと。

●妊娠中のもの。●重篤な疾病にかかっていることが明らかなもの。

2.対象動物の使用制限等

対象動物が、次のいずれかに該当すると認められる場合は、健康状態及び体質等を考慮し、注射適否の判断を慎重に行うこと。

●元気・食欲不振、発熱、下痢又は重度の皮膚疾患など臨床上異常が認められるもの。●疾病の治療を継続中又は治癒後間がないもの。●明らかな栄養障害があるもの。●以前にも本剤又は他のワクチンにより、アナフィラキシー等の異常な副反応を呈したことがあるもの。●授乳中のもの。

●寄生虫に感染しているもの。●1年以内にてんかん様発作を示したもの。

3.重要な基本的注意

●注射後、副反応(アナフィラキシー等)による事故を最小限にとどめるため、しばらくは観察をつづけること。帰宅させる場合には、なるべく安静につとめながら帰宅させ、当日は帰宅後もよく観察するように指導すること。●3ヵ月齢以下の若齢犬では副作用の発現が多いため、飼い主に対しその旨を十分に説明し、飼い主の理解を得た上で注射し、その後の経過観察を十分に行うこと。●本剤と他のワクチンとの同時接種は避けること。また、本剤注射前に他のワクチンを注射している場合には、生ワクチンにあっては1ヵ月以上、不活化ワクチンにあっては1週間以上の間隔をあけること。なお、本剤注射後、他のワクチンを注射する場合には、1ヵ月以上の間隔をあけること。●移行抗体の高い個体では、ワクチンによる抗体産生が抑制されることがあるので、幼若な犬への注射は移行抗体の消失する時期を考慮すること。●潜伏感染の状態の犬に注射した場合、その疾病を誘発することがあるので注意すること。●ワクチン注射後、一過性の犬アデノウイルス(2型)及び犬パルボウイルスの排泄が認められ、感受性犬に感染することがあるがワクチンウイルスの安全性については確認されている。

4.副反応

●過敏な体質の犬では、アレルギー反応(顔面腫脹(ムーンフェイス)、掻痒、じん麻疹等)又はアナフィラキシー反応(虚脱、貧血、血圧低下、呼吸促拍、呼吸困難、体温低下、流涎、ふるえ、痙攣等)が起こることがある。アナフィラキシー反応は、本剤注射後30分位までの発現が多い。

●注射後、一過性の元気・食欲減退、疼痛、腫脹、発熱、嘔吐、下痢等を示すことがある。●副反応が認められた場合は、速やかに獣医師の診察を受けるように指導するとともに、副反応に対して適切な処置を行うこと。

5.相互作用

●免疫抑制剤を用いて治療された犬はワクチンの効果が阻害されることがあるので考慮すること。

6.取扱い上の注意

●注射器具は滅菌又は煮沸消毒されたものを使用すること。薬剤により消毒した器具又は他の薬剤に使用した器具は使用しないこと(ガス滅菌によるものを除く。)。なお、乾熱、高圧蒸気滅菌又は煮沸消毒等を行った場合は、室温まで冷えたものを使用すること。●ワクチン容器のゴム栓は消毒し、無菌的に扱うこと。●注射器具は1頭ごとに取り替えること。●使用時によく振り混ぜて均一とすること。●本剤の溶解は使用直前に行い、溶解後は速やかに使用すること。●注射部位は消毒し、注射時には注射針が血管に入っていないことを確認してから注射すること。

7.その他の注意

●本剤はシードロットシステムにより製造され、国家検定を受ける必要のないワクチンであるため、容器又は被包に「国家検定合格」と表示されていない。

【包装】 1セット:乾燥ワクチン1頭分×10バイアル
溶解用液1mL×10バイアル

【製品情報お問い合わせ先】
日本ビルパック株式会社 TEL.0120-550-700

製造販売業者:
日本ビルパック株式会社
〒611-0041 京都府宇治市槇島町二十四16番地

添付文書情報はこちら▶

獣医師、薬剤師等の医薬関係者は、本剤による副作用などによると疑われる疾病、障害若しくは死亡の発生又は本剤の使用によるものと疑われる感染症の発生に関する事項を知った場合において、保健衛生上の危害の発生又は拡大を防止するために必要があると認めるときは、上記【製品情報お問い合わせ先】に連絡するとともに、農林水産省動物医薬品検査所(https://www.maff.go.jp/nval/iyakutou/fukusayo/sousa/index.html)にも報告をお願いします。