

貯法	室温保存	承認指令書番号	農林水産省指令 18 消安第 3039 号
		販売開始	1990年1月

使用前に必ず本書を読み、内容を理解したうえで使用してください。  
また、本書を必要なときに参照できるように大切に保管してください。

### 動物用医薬品

#### 止瀉薬

# ポンテ散

## PONTE POWDER

動物にとって胃腸ほど大切な器官はありません。胃腸が悪いとエサを食べても栄養分を吸収することができず、発育が遅れます。特に幼齢の頃の下痢は危険です。ぐんぐん発育し、骨格、筋肉、内臓が強くなり大きくなって、将来能力の高い健康な家畜になる基礎を作る幼齢時に下痢が続くことは、経済動物としての価値を損ない、畜主に大きな損害を与えることがあります。

本剤は、家畜の胃腸の働きを整え、下痢を治す働きをします。家畜の胃腸は病原菌や異常発酵によりできた有毒成分に冒されたり、神経や胃腸の故障により栄養分の消化吸収が邪魔されたりしやすいものです。

本剤は家畜に多発する病原菌を特定できない単純性下痢の予防・治療剤ですが、このような悪い状態を予防し、治癒させる消化器内殺菌剤、収斂剤等を含んでいる製剤です。

### 【成分及び分量】

本剤 1 g 中

アクリノール水和物	6 mg
タンニン酸ベルベリン	12 mg
タンニン酸アルブミン	300 mg
次硝酸ビスマス	120 mg
天然ケイ酸アルミニウム (賦形剤)	562 mg

### 【効能又は効果】

単純性下痢

### 【用法及び用量】

下記量を 1 回量とし、1 日 1 ～ 3 回経口投与する。

体 重	300 kg以上	100 ～ 300 kg	100 kg以下
牛	25 ～ 70 g	13 ～ 35 g	7 ～ 15 g
馬	20 ～ 50 g	10 ～ 25 g	5 ～ 12 g

体 重	100 kg以上	30 ～ 100 kg	10 ～ 30 kg	10 kg以下
豚	5 ～ 10 g	2.5 ～ 5 g	1.7 ～ 3.3 g	1 ～ 2 g
緬・山羊	5 ～ 14 g	2.5 ～ 7 g	1.7 ～ 5 g	1 ～ 3 g

体 重	20 kg以上	5 ～ 20 kg	5 kg以下
犬	1.25 ～ 1.75 g	0.6 ～ 0.9 g	0.3 ～ 0.4 g

体 重	3 kg以上	1 ～ 3 kg	1 kg以下
猫	0.25 ～ 0.35 g	0.125 ～ 0.17 g	0.06 ～ 0.09 g

体 重	大すう、成鶏	中すう	幼すう
鶏	0.125 ～ 0.175 g	0.06 ～ 0.09 g	0.03 ～ 0.04 g

### 休業期間

本剤投与後、下記の期間は食用に供する目的で出荷等を行わないこと。

牛	7 日間
馬	7 日間
豚	7 日間
緬・山羊	7 日間
鶏	7 日間

### 【使用上の注意】

#### (基本的事項)

1. 守らなければならないこと

(一般的注意)

- ・本剤は獣医師の指導の下で使用すること。
- ・本剤は効能・効果において定められた目的にのみ使用すること。

- ・本剤は定められた用法・用量を厳守すること。
- ・本剤投与後、下記の期間は食用に供する目的で出荷等を行わないこと。
 

牛	: 7日間
馬	: 7日間
豚	: 7日間
緬・山羊	: 7日間
鶏	: 7日間

(取扱い及び廃棄のための注意)

- ・本剤の外観又は内容物に異常が認められた場合は使用しないこと。
- ・本剤は他の薬剤と混合して使用しないこと。
- ・開封後はできるだけ速やかに使い切ること。
- ・小児の手の届かないところに保管すること。
- ・誤用を避け、品質を保持するため、他の容器に入れかえないこと。
- ・本剤の保管は直射日光、高温及び多湿を避けること。
- ・使用済みの容器は、地方公共団体条例等に従い処分すること。
- ・本剤を廃棄する際は、環境や水系を汚染しないように注意し、地方公共団体条例等に従い処分すること。

2. 使用に際して気を付けること

(使用者に対する注意)

- ・誤って本剤を飲み込んだ場合は、直ちに医師の診察を受けること。
- ・本剤が誤って眼、鼻、口等に入ったときは、直ちに水で洗浄やうがい等を行い、医師の診察を受けること。
- ・本剤を使用した後あるいは皮膚に付着したときは石けん等でよく洗うこと。

(対象動物に関する注意)

- ・強制経口投与する場合は、誤嚥に注意すること。
- ・ビン等で強制経口投与する場合は、誤嚥性肺炎防止のため下記事項は必ず守ること。
  - ① 一升瓶は使用しないこと。
  - ② 牛の頭を高く上げ、ビンを強く出し入れしたり、揺る行為は避けること。
  - ③ 口角からビンの首まで挿入し、舌の運動を阻害しないように、静かにビンを傾けて、投与すること。
- ・副作用が認められた場合には、速やかに獣医師の診察を受けること。

【有効期間】

36 カ月

【包装】

1 kg (50 g × 20 袋)

【成分の作用】

☆アクリノール水和物

殺菌・消毒作用を持っています。人の下痢止めにもよく使われている殺菌剤です。

☆タンニン酸ベルベリン

殺菌作用と収斂作用を併せ持つ薬で、下痢止めによく使われています。

☆タンニン酸アルブミン

強い収斂作用を持ち、下痢止めとして使われるタンニン酸に卵白蛋白のアルブミンを結合させタンニン酸の渋みをなくした収斂剤です。腸内でタンニン酸を遊離し、強い収斂・止瀉作用を現します。タンニン酸の渋みをなくした収斂剤です。

☆次硝酸ビスマス

局所収斂・粘膜保護作用をもっています。

【製品情報お問い合わせ先】

フジタ製薬株式会社  
〒193-0942 東京都八王子市栲田町1211  
電話 (042) 661-5528 (代)

獣医師、薬剤師等の医薬関係者は、本剤による副作用などによると疑われる疾病、障害若しくは死亡の発生又は本剤の使用によるものと疑われる感染症の発生に関する事項を知った場合において、保健衛生上の危害の発生又は拡大を防止するために必要があると認めるときは、上記【製品情報お問い合わせ先】に連絡するとともに、農林水産省動物医薬品検査所 (<http://www.maff.go.jp/nval/iyakutou/fukusayo/sousa/index.html>) にも報告をお願いします。

製造販売元



**フジタ製薬株式会社**

東京都品川区上大崎2丁目13番2号  
<http://www.fujita-pharm.co.jp>

**FUJITA PHARM**