

| | | | |
|----|------|---------|-----------------------|
| 貯法 | 気密容器 | 承認指令書番号 | 農林水産省指令 23 動薬第 4073 号 |
| | | 販売開始 | 1969年11月 |

使用前に必ず本書を読み、内容を理解したうえで使用してください。
また、本書を必要なときに参照できるように大切に保管してください。

動物用医薬品

牛尿石症治療・予防薬

キートン[®]

KEYTON

牛は尿がアルカリ性のため尿石症になりやすく、牡や去勢の肥育牛では大きな問題になっています。本剤は、尿石症の治療及び予防に効果のある塩化アンモニウム、ビタミンA及びビタミンD₃、リン酸水素カルシウムを配合した牛の尿石症の治療及び予防剤です。

【成分及び分量】

| | |
|---------------------|----------|
| 本剤 1 g 中 | |
| 塩化アンモニウム | 400 mg |
| ビタミン A | 2,000 IU |
| ビタミン D ₃ | 400 IU |
| リン酸水素カルシウム | 300 mg |

【効能又は効果】

牛：尿石症の治療及び予防

【用法及び用量】

治療：1日1回体重1kg当たり125～150mgを3～7日間経口投与する。

予防：1日1回体重1kg当たり60～80mgを連日経口投与する。

【使用上の注意】

(基本的事項)

- 守らなければならないこと
(一般的注意)
 - 本剤は獣医師の指導の下で使用すること。
 - 本剤は効能・効果において定められた目的にのみ使用すること。
 - 本剤は定められた用法・用量を厳守すること。
 (取扱い及び廃棄のための注意)
 - 本剤の外観又は内容物に異常が認められた場合は使用しないこと。
 - 本剤は他の薬剤と混合して使用しないこと。
 - 本剤は有効期間を設定してある動物用医薬品なので使用期限を過ぎた製品は使用しないこと。
 - 本剤に含まれるビタミンAは、アルカリ性、日光によって急速に分解するので、できるだけ速やかに使い切ることにし、使い残しは暗所に保存すること。
 - 小児の手の届かないところに保管すること。
 - 誤用を避け、品質を保持するため、他の容器に入れかえないこと。
 - 本剤の保管は直射日光、高温及び多湿を避けること。
 - 使用済みの容器は、地方公共団体条例等に従い処分すること。
 - 本剤を廃棄する際は、環境や水系を汚染しないように注意し、地方公共団体条例等に従い処分すること。
- 使用に際して気を付けること
(使用者に対する注意)
 - 誤って本剤を飲み込んだ場合は、直ちに医師の診察を受けること。

- ・本剤が誤って眼、鼻、口等に入ったときは、直ちに水で洗浄やうがい等を行い、医師の診察を受けること。
- ・本剤を使用した後あるいは皮膚に付着したときは石けん等でよく洗うこと。
(対象動物に関する注意)
- ・副作用が認められた場合には、速やかに獣医師の診察を受けること。

(専門的事項)

① 副作用

- ・ビタミンDは、血中カルシウム量が高いときに投与すると重篤な副作用（発育不良、肺炎様症状、腎不全等）を引き起こすという報告がある。特に幼若動物に投与する場合は注意すること。

② 過量投与

- ・ビタミンAは、過量投与によるビタミンA過剰症状（皮膚の変色、骨の肥大性増殖等）が起こることが報告されている。
- ・ビタミンDは、過量投与による中毒（骨の脱カルシウム、軟組織化骨等）が殆ど全ての動物種で報告されている。猫では要求量が低く、時に中毒しやすい。

【有効期間】

18 カ月

【包装】

50 g × 20 包

【製品情報お問い合わせ先】

フジタ製薬株式会社

〒193-0942 東京都八王子市柵田町1211

電話 (042) 661-5528 (代)

獣医師、薬剤師等の医薬関係者は、本剤による副作用などによると疑われる疾病、障害若しくは死亡の発生又は本剤の使用によるものと疑われる感染症の発生に関する事項を知った場合において、保健衛生上の危害の発生又は拡大を防止するために必要があると認めるときは、上記【製品情報お問い合わせ先】に連絡するとともに、農林水産省動物医薬品検査所 (<http://www.maff.go.jp/nval/iyakutou/fukusayo/sousa/index.html>) にも報告をお願いします。

製造販売元



フジタ製薬株式会社

東京都品川区上大崎2丁目13番2号

<http://www.fujita-pharm.co.jp>

FUJITA PHARM