

ホルモン製剤

要指示医薬品 指定医薬品

動物用ルテオーゲン[®]L

持続型プロゲステロン注射液

【本質の説明又は製造方法】

本剤はプロゲステロンを特殊な溶媒で溶かし、注射後局所に多数の微細な結晶が析出する持続型のプロゲステロン製剤で、油性注射剤と比べてかなり長時間、またペレットなどに比べてすみやかにその効果を発揮する。

本剤を大動物に注射すると、約10日間血液中に比較的高濃度で持続する。

【成分及び分量】 本品1アンプル(5mL)中

成分		分量
主剤	プロゲステロン	200mg
無痛化剤	ベンジルアルコール	750mg

【効能又は効果】

牛(雌): 習慣性流産の防止、受精卵着床障害、卵胞のう腫、胎盤停滞の予防

馬(雌): 習慣性流産の防止

【用法及び用量】

通常1回1頭当たりプロゲステロンとして下記の量を筋肉内に注射する。

牛(雌): 50~600mg

馬(雌): 50~600mg

【使用上の注意】

「基本的事項」

1. 守らなければならないこと

(一般的注意)

- ・本剤は要指示医薬品であるので獣医師等の処方箋・指示により使用すること。
 - ・本剤は効能・効果において定められた目的にのみ使用すること。
 - ・本剤は定められた用法・用量を厳守すること。
- (取扱い及び廃棄のための注意)
- ・使用した後、あるいは使用者の皮膚に付着したときは、石けん等でよく洗うこと。
 - ・注射筒は必ずアルコール滅菌したものをを用いること。煮沸滅菌した注射筒を濡れたまま用い、本品を吸いあげると、結晶が析出することがある。
 - ・アンプル内で結晶が析出した場合は、微温湯で加温し、軽く振り、結晶を完全に溶解すること。
 - ・小児の手の届かないところに保管すること。

- ・本剤の保管は直射日光及び高温を避けること。
- ・使用済みの容器は、地方公共団体条例等に従い処分すること。
- ・本剤を廃棄する際は、環境や水系を汚染しないように注意し、地方公共団体条例等に従い処分すること。
- ・使用済みの注射針は、針回収用の専用容器に入れること。針回収用の容器の廃棄は、産業廃棄物収集運搬業及び産業廃棄物処分の許可を有した業者に委託すること。

2. 使用に際して気を付けること

(使用者に対する注意)

- ・誤って注射された者は、直ちに医師の診察を受けること。(牛及び馬に関する注意)
- ・副作用が認められた場合には、速やかに獣医師の診察を受けること。

「専門的事項」

(対象動物の使用制限等)

- ・本剤は分娩予定5日以内の動物には投与しないこと。(重要な基本的注意)
- ・本剤は筋肉内注射以外には使用しないこと。
- ・本剤は静脈注射をしないこと。(その他の注意)
- ・本剤の有効成分であるプロゲステロンは、発がん性を示唆する報告がある。

【使用期限】 包装に表示の使用期限内に使用すること。

【包装】 5mL×10アンプル

【製品情報お問い合わせ先】

日本全薬工業株式会社

〒963-0196 福島県郡山市安積町笹川字平ノ上1-1

フリーダイヤル 0120-452-793

受付時間 9:00-17:00(土日祝日・弊社休業日を除く)

製造販売元

 日本全薬工業株式会社
ZENOAQ 福島県郡山市安積町笹川字平ノ上1-1

獣医師、薬剤師等の医薬関係者は、本剤による副作用などによると疑われる疾病、障害若しくは死亡の発生又は本剤の使用によるものと疑われる感染症の発症に関する事項を知った場合において、保健衛生上の危害の発生又は拡大を防止するために必要があると認めるときは、上記【製品情報お問い合わせ先】に連絡するとともに、農林水産省動物医薬品検査所 (<http://www.maff.go.jp/nval/iyakutou/fukusayo/sousa/index.html>) にも報告をお願いします。