

2017年4月改訂
貯法 室温

動物用医薬品

承認指令書番号	25 動薬第 1232 号
販売開始	1995 年 12 月
再審査結果	2005 年 2 月

プロゲステロン腔挿入剤

要指示医薬品 指定医薬品

10 個入り

イージーブリード

T.M.



【成分及び分量】

品名	イージーブリード
有効成分	プロゲステロン
含量	本品 1 個中 1.9g

【効能又は効果】 牛 発情周期の同調、鈍性発情、卵巢静止

【用法及び用量】

(1) 用法

薬剤の挿入：

本剤 1 個をとり、あらかじめ消毒した挿入用器具に、2 つに分かれた翼部の先端を合わせて装填する。

牛の外陰部を清潔にした後、装填後の挿入用器具を産道粘滑剤に浸し、子宮頸管部に接触するまで静かに挿入する。挿入用器具を操作して本剤を腔深部に留置し、挿入用器具を引き抜く。

本剤の尾端部にある紐は外陰部から出るようにしておく。

薬剤の除去：

尾端部にある紐を引いて腔より本剤を引き取る。

(2) 用量

牛 発情周期の同調：1 回に 1 個を挿入し、12 ～ 15 日間腔内に留置する。

鈍性発情：1 回に 1 個を挿入し、7 日間腔内に留置する。

卵巢静止：1 回に 1 個を挿入し、12 日間腔内に留置する。

39001415-03/17

【使用上の注意】

(基本的事項)

1. 守らなければならないこと

(一般的事項)

- ・本剤は要指示医薬品であるので獣医師等の処方箋・指示により使用すること。
- ・本剤は効能・効果において定められた目的のみ使用すること。
- ・本剤は定められた用法・用量を厳守すること。
- ・本剤使用中の牛を食用に供する目的で出荷するときは出荷前に本剤を除去すること。

(牛に対する注意)

- ・本剤は牛の腔内挿入のみに使用すること。

(取扱い及び廃棄のための注意)

- ・畜体の感染を防ぐため、本剤の挿入用器具への装填は清潔な状態で行うこと。挿入用器具は 1 頭ごとに洗浄、消毒し清潔な状態で使用すること。
- ・一度使用した本剤の再使用はしないこと。挿入期間中に脱落した時は、残余の期間、未使用の本剤を再挿入すること。
- ・小児の手の届かないところに保管すること。
- ・直射日光・加温又は凍結は製品の品質に影響を与えるので避けること。
- ・開封後は速やかに使用すること。
- ・使用後の本剤は環境汚染のないよう焼却など適切な方法で処分すること。

2. 使用に際して気を付けること

(使用者に対する注意)

- ・本剤はホルモン剤であるので、扱うときは手袋を着用すること。
- ・使用した後、あるいは使用者の皮膚に付着したときは、石けんでよく洗うこと。

(専門的事項)

① 対象動物の使用制限等

- ・腔の異常な牛には使用できない。

② 重要な基本的事項

- ・挿入時に汚染すると感染症の原因となるので、外陰部周囲の消毒を丁寧に行うこと。
- ・脱落の原因とならないよう、腔深部に留置すること。
- ・発情周期の同調では通常本剤除去後 5 日以内に発情徴候が発現するが、疾病牛、栄養不良牛、過度のストレスを受けている牛では効果が得られないことがある。

製品番号 No.

使用期限

- ・鈍性発情及び卵巢静止の場合、栄養不良又は過度のストレス、他の疾病を併発している牛では効果が得られないことがある。

③ 副作用

- ・本剤の使用により軽度の腔炎や腔粘液の白濁化、膿汁化、漏出を伴うことがあるが、通常除去後数日で回復する。また、挿入後しばらくの間、異物感から背を丸めたり、後肢を上げたりする牛があるが、数時間後には正常に戻る。まれに、一過性の乳量の低下を伴うことがあるが数日で回復する。

④ その他の注意

- ・本剤の有効成分であるプロゲステロンは、発ガン性を示唆する報告がある。

【包装】

10 個

【製品情報のお問合せ先・販売元】

販売元 株式会社 家畜改良事業団

〒135-0041

東京都江東区冬木 11 番 17 号 イシマビル

TEL: 03-5621-8911(代)

製造販売 サージミヤワキ株式会社

〒141-0022

東京都品川区東五反田 1 丁目 19 番 2 号

注意—獣医師等の処方箋・指示により使用すること

獣医師・薬剤師等の医療関係者は、本剤による副作用などによると疑われる疾病、障害もしくは死亡の発生又は本剤の使用によると疑われる感染症の発生に関する事項を知った場合において、保健衛生上の危害の発生又は拡大を防止するため必要があると認めるときは、上記【製品情報お問合せ先】に連絡するとともに、農林水産省動物医薬品検査所 (<http://www.maff.go.jp/nval/iyakutou/fukusayo/sousa/index.html>) にも報告をお願いします。

本剤には有効期限はありませんが、左記頃までの使用をお勧めします。

39001416-03/17