

猫に寄生する線虫類及び糸虫類の駆除剤

ドロンタール<sup>TM</sup>錠

2021年9月改訂

貯法

室温保存

90204670

## 【成分及び分量】

品名	ドロンタール錠
有効成分	ブラジクアンテル、ハモ酸ピランテル
含量	本品1錠中(339mg)に、ブラジクアンテル20mg、ハモ酸ピランテル230mgを含有する。

## 【効能又は効果】

猫・猫回虫、猫鉤虫、瓜実糸虫、猫糸虫の駆除

## 【用法及び用量】

通常1回、体重1kg当たりブラジクアンテル5mg、ハモ酸ピランテル57.5mg(体重4kg当たり1錠)を基準量として次の量を経口投与する。

体重 0.5kg以上 2kg未満	1/2錠
体重 2kg以上 4kg未満	1錠
体重 4kg以上 6kg未満	1 1/2錠
体重 6kg以上 8kg未満	2錠

## 【使用上の注意】

(基本的事項)

## 1. 守らなければならないこと

(一般的注意)

- ・本剤は効能・効果において定められた目的にのみ使用すること。
- ・本剤は定められた用法・用量を厳守すること。
- ・本剤は獣医師の指導の下で使用すること。

(取扱い及び廃棄に関する注意)

- ・小児の手の届かないところに保管すること。
- ・本剤の保管は直射日光、高温及び多湿を避けること。
- ・誤用を避け、品質を保持するため、他の容器に入れかえないこと。
- ・使用済みの容器は、地方公共団体条例等に従い処分すること。
- ・本剤を廃棄する際は、環境や水系を汚染しないように注意し、地方公共団体条例等に従い処分すること。

## 2. 使用に際して気を付けること

(使用者に対する注意)

- ・本剤の有効成分ブラジクアンテルは、有機溶剤等に溶解した場合等、溶液の状態においては皮膚から吸収されることが知られているので、分割投与する場合は薬剤が投薬作業者の皮膚に触れることのないように注意すること。なお、誤って皮膚に付着した場合には、直ちに石けんで洗い流すこと。

(猫に関する注意)

- ・副作用が認められた場合には、速やかに獣医師の診察を受けること。

(取扱い上の注意)

- ・本剤は猫以外の動物に使用しないこと。

## (専門的事項)

## ① 対象動物の使用制限等

- ・妊娠している猫には投与しないこと。
- ・本剤は4週齢未満の猫には投与しないこと。
- ・本剤は体重0.5kg未満の猫には使用しないこと。

## ② 重要な基本的注意


- ・本剤投与による瓜実糸虫駆除の確認の際、体節がバラバラになり半透明の状態で排出されるので注意深く観察するよう飼い主に指導すること。

## ③ 相互作用

- ・本剤の有効成分であるハモ酸ピランテルは、ピペラジンと互いに拮抗する可能性があるため、併用は避けることが望ましい。

## 【製品情報お問い合わせ先】

エランコジャパン株式会社  
〒107-0052  
東京都港区赤坂四丁目15番1号  
お問い合わせ先: ☎0120-126-471

ドロンタール、Elanco 及び  : エランコ又はその関連会社の商標です。

【製造販売元(輸入発売元)】

エランコジャパン株式会社  
〒107-0052  
東京都港区赤坂四丁目15番1号