



動物用医薬品

# ネポレックス<sup>®</sup> SP 50

## ハエ幼虫発育制御剤

### 【成分及び分量】

本剤100g中シロマジン50g含有

### 【効能又は効果】

畜舎内及び周辺の衛生害虫(ハエの幼虫)の駆除

### 【用法及び用量】

畜・鶏舎内、及びその周辺のハエの発生又は、幼虫の生息する場所に水に溶解して散布する。

ハエの幼虫：畜・鶏舎床面積、1m<sup>2</sup>に対し本剤1g(シロマジンとして0.5g)を250~1000mLの水に溶かした水溶液を畜・鶏糞上に適宜散布する。

# 250g

### 使用方法

- 1m<sup>2</sup>当り本剤1gを0.25~1リットルの水に溶かして散布。
- 攪拌は十分行うこと。

製造販売業者(輸入発売元)

エランコジャパン株式会社  
東京都港区赤坂四丁目15番1号

ネポレックス、Elanco、：エランコ又はその関連会社の商標です。

### 【使用上の注意】

(基本的事項)

- 守らなければならないこと  
(一般的注意)
  - ・ 本剤は効能・効果において定められた目的にのみ使用すること。
  - ・ 本剤は定められた用法・用量を厳守すること。
  - ・ 畜・鶏体への直接噴霧はしないこと。
  - ・ 本剤は、ハエの幼虫に選択的に作用し、成虫には作用しないので、成虫駆除の目的で使用しないこと。
  - ・ 畜・鶏舎内の衛生害虫の駆除に用いるときは、薬剤が畜・鶏体に直接かからないようにすること。
- (取扱い及び廃棄のための注意)
  - ・ 食品、食器、飼料等と区別し、動物による盗食のおそれがなく、小児の手の届かない乾燥した暗所に保管すること。
  - ・ 使用後、残った薬剤は必ず保管場所に戻し、容器は封をしておくこと。
  - ・ 散布に当たっては、かけむらのないように散布すること。ただし、環境を汚染しないよう乱用を避けること。特に散布液が直接河川、湖沼、海域又は養殖池に流入するおそれのある場所では使用しないこと。
  - ・ 小分けしたり、水で希釈するときは、食品用の容器等、誤用のおそれのあるものを使用しないこと。
  - ・ 希釈の際は十分に攪拌をすること。その際、直接手指でかき混ぜるようなことはしないこと。
  - ・ 希釈した液は不安定なので、その都度必要量を調製し、また、直射日光の下に放置しないこと。
  - ・ 家畜・家禽の飼料、飼料箱、飲水、飲水器、搾乳機械、卵等はあらかじめ他へ移すかあるいは格納するなどの措置を施し、薬剤がかからないようにすること。採卵後又は給餌前に散布すること。
  - ・ 使用済みの空容器等は、地方公共団体条例等に従い処分すること。
- 使用に際して気を付けること  
(使用者に対する注意)
  - ・ 万一、身体に異常を来たした場合や誤って薬剤を飲み込んだ場合は、直ちにトリアジン系の殺虫剤を使用した旨を医師に申し出て診察を受けること。
  - ・ 事故防止のため、作業時には防護メガネ、マスク、手袋等を着用すること。
  - ・ 使用した後、あるいは皮膚に付いたときは、手と顔を石けんでよく洗い、水で十分うがいをする。なお、眼に入った場合は、直ちに水でよく洗い流すこと。
  - ・ アレルギー体質等で刺激を感じた場合には、直ちに使用を中止すること。
- (取扱い上の注意)
  - ・ 希釈又は散布に用いた器材は、石けん水でよく洗い、特に散布器はよく手入れをしておくこと。
  - ・ 金属面にはサビを生じるおそれがあるので注意すること。

### 【製品情報お問い合わせ先】

エランコジャパン株式会社 製品お問い合わせ窓口  
〒107-0052 東京都港区赤坂四丁目15番1号  
TEL：0120-41-8564  
月～金 / 9時～12時、13時～17時(祝祭日及び会社休業日を除く)

獣医師、薬剤師等の医薬関係者は、本剤による副作用などによると疑われる疾病、障害若しくは死亡の発生又は本剤の使用によるものと疑われる感染症の発症に関する事項を知った場合において、保健衛生上の危害の発生又は拡大を防止するために必要があると認めるときは、上記【製品情報お問い合わせ先】に連絡するとともに、農林水産省動物医薬品検査所(<http://www.maff.go.jp/nval/iyakutou/fukusayo/sousa/index.html>)にも報告をお願いします。

ネポレックスSP50は、  
イエバエ、ヒメイエバエ、サシバエ  
などのハエ幼虫の発育を、  
阻害して駆除するハエ幼虫発育  
制御剤(IGR)です。

2019年7月改訂

貯法

室温保存

承認指令書番号

7畜A第2076号

®登録商標

(Batch nr) 製造番号

(Exp. date) 使用期限

IMPRINT AREA  
for 2, 3 or 4 ROWS