

2026年7月 改訂

貯 法 室温保存

日本標準商品分類番号 879539

承認指令書番号	農林水産省指令 元動薬第 2601 号
販売開始	1998 年 9 月

動物用医薬品

消炎鎮痛パップ剤

クラージェン[®]ネオ

CRAHGEN[®]
NEO

1kg

【成分及び分量】

本剤1g中
サリチル酸メチル 10mg
dl-メントール 1mg
オウバク末 2mg

【効能又は効果】

筋炎、関節炎、神経炎、腱炎、腱鞘炎、
靱帯炎、打撲、捻挫

【用法及び用量】

本剤の適量を取り、適宜家畜の患部に
塗布する。

【使用上の注意】 (基本的事項)

1. 守らなければならないこと
(一般的注意)
 - ・本剤は獣医師の指導の下で使用すること。
 - ・本剤は効能・効果において定められた目的にのみ使用すること。
 - ・本剤は定められた用法・用量を厳守すること。(対象動物に関する注意)
 - ・本剤は外用以外には使用しないこと。(取扱い及び廃棄のための注意)
 - ・本剤は有効期間を設定してある動物用医薬品なので使用期限を過ぎた製品は使用しないこと。
 - ・開封後はできるだけ速やかに使い切ること。
 - ・品質保持のため、使用後は容器のフタをしっかりとしめること。
 - ・誤用を避け、品質を保持するため、他の容器に入れかえないこと。
 - ・小児の手の届かないところに保管すること。
 - ・本剤の保管は直射日光、高温及び多湿を避けること。
 - ・本剤は凍結により分離するので、凍結させないこと。
 - ・使用済みの容器は、地方公共団体条例等に従い処分すること。
 - ・本剤を廃棄する際は、環境や水系を汚染しないように注意し、地方公共団体条例等に従い処分すること。
2. 使用に際して気を付けること
(使用者に対する注意)
 - ・誤って薬剤を飲み込んだ場合は、直ちに医師の診察を受けること。
 - ・本剤が誤って眼、鼻、口等に入ったときは、直ちに水で洗浄やうがい等を行い医師の診察を受けること。
 - ・本剤を使用した後あるいは皮膚に付着したときは石けん等でよく洗うこと。(対象動物に関する注意)
 - ・副作用が認められた場合には、速やかに獣医師の診察を受けること。
 - ・本剤は、刺激性があるので目や傷及びその周辺には使用しないこと。
 - ・本剤を塗布するときは、患部の毛並みの逆に広く擦り込み、更に毛並みに沿って下方になでて壁土を塗るようにすること。
 - ・本剤の効果を持続させるには、塗布した上に和紙や布類等を巻いて乾きを防ぐこと。
 - ・本剤を続けて使用する場合、最初に塗布した本剤を完全に除去して塗布すること。(取扱い上の注意)
 - ・本剤は生薬を配合しているため色調が変化することがある。

(専門的事項)

- ① 重要な基本的注意
 - ・本剤の有効成分であるサリチル酸メチルは、経口又は腹腔内投与によるラットの動物実験で催奇形作用が報告されているので、妊娠動物及び妊娠している可能性のある動物への使用の可否については慎重に判断すること。
- ② その他の注意
 - ・本剤の有効成分であるサリチル酸メチルは実験動物において変異原性を示したとの報告がある。

【有効期間】

24 カ月

【製品情報お問い合わせ先】

日本ビルバック株式会社
TEL (042) 661-5528 (代)



製造番号
使用期限



本 体:PE,M,PA
キャップ:PP

獣医師、薬剤師等の医薬関係者は、本剤による副作用などによると疑われる疾病、障害若しくは死亡の発生又は本剤の使用によるものと疑われる感染症の発生に関する事項を知った場合において、保健衛生上の危害の発生又は拡大を防止するために必要があると認めるときは、上記【製品情報お問い合わせ先】に連絡するとともに、農林水産省動物医薬品検査所(<http://www.maff.go.jp/nval/iyakutou/fukusayo/sousa/index.html>)にも報告をお願いします。

製造販売元

日本ビルバック株式会社
京都府宇治市槇島町二十四 1 6 番地