

2017年7月作成

貯 法 室温保存

## 動物用医薬品

### 複合抗生物質製剤

要指示医薬品 指定医薬品

承認指令書番号 14生畜第3611号

# ハイポリス

## 泌乳期乳房炎治療剤

#### 【本質の説明又は製造方法】

本剤は、ベンジルペニシリンプロカインと硫酸フラジオマイシンを配合した乳房注入用抗生物質製剤で、泌乳期の乳房炎治療に効果を示します。

#### 【成分及び分量】 1容器(3g)中

成 分		分 量
主 剤	ベンジルペニシリンプロカイン	300,000単位
	フラジオマイシン硫酸塩	300mg(力価)
着色剤	青色1号	25mg

#### 【効能又は効果】

牛：泌乳期の乳房炎

#### 【用法及び用量】

1日1回1分房当り本剤として下記の量を乳房内に注入する。

牛：1容器

#### 【使用上の注意】

##### 「基本的事項」

#### 1.守らなければならないこと

##### (一般的注意)

- ・本剤は要指示医薬品であるので獣医師等の処方箋・指示により使用すること。
- ・本剤は効能・効果において定められた適応症の治療にのみ使用すること。
- ・本剤は定められた用法・用量を厳守すること。
- ・本剤の使用に当たっては、治療上必要な最小限の期間に止めることとし、過剰にわたる連続投与は行わないこと。
- ・本剤投与後、下記の期間は食用に供する目的で出荷等行わないこと。

牛：7日間 牛乳：108時間

##### (取扱い及び廃棄のための注意)

- ・小児の手の届かないところに保管すること。
- ・本剤の保管は直射日光、高温及び多湿を避けること。
- ・使用済みの容器は、地方公共団体条例等に従い処分すること。
- ・本剤を廃棄する際は、環境や水系を汚染しないように注意し、地方公共団体条例等に従い処分すること。

#### 2.使用に際して気を付けること

##### (使用者に対する注意)

- ・誤って薬剤を飲み込んだ場合は、直ちに医師の診察を受けること。

- ・本剤の有効成分(フラジオマイシン硫酸塩)には人に対して起炎性があるとの報告があることから、取扱いに際しては、目や皮膚に付着しないよう注意すること。

(牛に関する注意)

- ・副作用が認められた場合には、速やかに獣医師の診察を受けること。

##### 「専門的事項」

##### (対象動物の使用制限)


- ・本剤の有効成分であるペニシリンは、過敏症反応をまれに起こすことがあるので、投与前に使用経歴や反応の有無を調べ、陽性動物には投与を避けること。

【使用期限】 包装に表示の使用期限内に使用すること。


【包装】 3gシリンジ×12

### 使用法

(深部挿入の場合)



(浅部挿入の場合) 先端部をねじり取るようにしてはずしてください。



\*：ストッパーに若干切り口が残りますが乳頭への影響はありません。

注意：注入針には手を触れないでください。

#### 【製品情報のお問い合わせ】


日本全薬工業株式会社

〒963-0196 福島県郡山市安積町笹川字平ノ上1-1

フリーダイヤル 0120-452-793

受付時間 9:00-17:00(土日祝日・弊社休業日を除く)

製造販売元



獣医師、薬剤師等の医薬関係者は、本剤による副作用などによると疑われる疾病、障害若しくは死亡の発生又は本剤の使用によるものと疑われる感染症の発症に関する事項を知った場合において、保健衛生上の危害の発生又は拡大を防止するために必要があると認めるときは、上記【製品情報お問い合わせ先】に連絡するとともに、農林水産省動物医薬品検査所 (<http://www.maff.go.jp/nval/iyakutou/fukusayo/sousa/index.html>) にも報告をお願いします。