

貯法	-190℃以下	承認指令番号	4動薬第2056号
----	---------	--------	-----------

## 動物用医薬品

## 動物用生物学的製剤

劇薬 要指示医薬品 指定医薬品

## MD生ワクチン(HVT)

(一般的名称 マレック病(七面鳥ヘルペスウイルス)生ワクチン(シード))

## 【本質の説明又は製造方法】

本剤は七面鳥ヘルペスウイルスFC126株を鶏胚培養細胞で増殖させ、その感染細胞浮遊液に凍害防止メジウムを加え、アンプルに1,000羽分用は1mL、2,000羽分用は2mLずつ分注密封後凍結したものであり、液体窒素容器内に貯蔵されている。凍結ワクチンは淡灰黄色で、溶解用液に溶かすと赤橙色の均質な細胞浮遊液となる。1羽分当たり $10^{3.0}$ FFU以上のワクチンウイルスが含まれている。

## 【成分及び分量】

凍結ワクチン 1,000ドーズ分中

成分		分量
主 剤	鶏胚初代細胞培養七面鳥ヘルペスウイルスFC126株(シード)	$10^{6.0}$ FFU以上
安定剤	トリプトース・ホスフェイト・ブロス	0.001475g
安定剤	牛血清	0.15mL
安定剤	L-グルタミン	0.0003g
安定剤	注射用ベンジルペニシリンカリウム	200単位
安定剤	注射用ストレプトマイシン硫酸塩	200 $\mu$ g(力価)
安定剤	炭酸水素ナトリウム	0.6mg
安定剤	イーグルMEM	残量
凍害防止剤	ジメチルスルホキシド	0.05mL

## 反すう動物由来物質

- (1) トリプトース・ホスフェイト・ブロス(動物の種類;牛 使用部位;乳)
- (2) 牛血清(動物の種類;牛 使用部位;血液)

## 【効能又は効果】

マレック病の予防

## 【用法及び用量】

凍結ワクチンを素早く融解後、別売りの溶解用液(品名:「マレック/バッグ」あるいは「マレック溶解用液-IZO」)で1羽当たり0.2mLとなるように溶かし、0.2mLずつを1日齢鶏の頸部皮下に接種する。

## 【使用上の注意】

(基本的事項)

## 1. 守らなければならないこと

(一般的注意)

- ・本剤は要指示医薬品であるので、獣医師等の処方箋・指示により使用すること。
- ・本剤は効能・効果において定められた目的にのみ使用すること。
- ・本剤は定められた用法・用量を厳守すること。

(使用者に対する注意)

- ・ワクチンを液体窒素から取り出す時、アンプルが破裂する恐れがあるので、危険防止のために皮膚を露出させない服装をし、マスク、防護メガネ及び手袋などを着用すること。
- ・作業後は、石けん等で手をよく洗うこと。

(鶏に関する注意)

- ・本剤の投与前には健康状態について検査し、次のいずれかに該当する異常を認めた場合は投与しないこと。
- ・元気・食欲不振、異常呼吸音、下痢など臨床上異常が認められるもの。
- ・明らかな栄養障害があるもの。

(取扱い及び廃棄のための注意)

- ・外観又は内容に異常を認めたものは使用しないこと。
- ・使用期限が過ぎたものは使用しないこと。
- ・本剤には他のワクチンや薬剤を加えて使用しないこと。
- ・溶解用液に抗生物質を添加すると、種類によってはワクチン力価が大幅に低下する場合がありますので注意すること。
- ・本剤の効力が失われるので、凍結アンプルを保存している液体窒素容器の液体窒素は絶対にきらさないこと。
- ・小児の手の届かないところに保管すること。
- ・直射日光又は加温は品質に影響を与えるので、避けること。
- ・使用済みの注射針は、針回収用の専用容器に入れること。針回収用の容器の廃棄は、産業廃棄物収集運搬業及び産業廃棄物処分業の許可を有した業者に委託すること。
- ・使用済みのアンプル及び溶解用液容器は、消毒又は滅菌後に地方公共団体条例等に従い処分、若しくは感染性廃棄物として処分すること。

## 2. 使用に際して気を付けること

(使用者に対する注意)

- ・誤って人に注射した場合は、患部の消毒等適切な処置をとること。誤って注射された者は、必要があれば本文書

を持参し、受傷について医師の診察を受けること。

## 本ワクチンの成分の特徴

微生物名	抗原		アジュバント	
	人獣共通感染症の当否	微生物の生・死	有無	種類
七面鳥ヘルペスウイルス	否	生	無	—

本ワクチン株は人に対する病原性はない。

- ・液体窒素容器は密封すると内圧が高まり爆発する危険があるので、密封しないこと。
- ・液体窒素は常に気化し、容器から窒素ガスが流れ出て酸素欠乏の原因になるので、配管や取り扱いは全て、乾燥した換気の良い場所で2人以上で行うこと。液体窒素の気化ガスを吸入しないこと。眠気が起こった場合は早急に新鮮な空気を入れてその場所を完全に換気すること。呼吸困難が起こった場合は人工呼吸を施すこと。これらの症状が持続したり、意識を失ったりした場合は直ちに医師を呼ぶこと。
- ・液体窒素は超低温なので、皮膚に触れると凍傷を起こすことがある。容器は傾けたり、転倒させないように気を付け、取り扱いには革手袋やカバー付き長靴を着用すること。
- ・液体窒素の補充時やアンプルの取扱い時には、タンクの転倒などに十分注意すること。
- ・ワクチンアンプルの開封時にアンプルの切断面で手指を切る恐れがあるので、手袋を着用するなど十分注意すること。

(鶏に関する注意)

- ・ワクチン投与後は温度管理に十分注意し、過酷な輸送や移動などのストレスを与えないこと。
- ・マレック病生ワクチンは、接種後一過性の免疫抑制が認められるとの報告があるので飼育管理に十分注意すること。

(取扱いに関する注意)

- ・溶解後は速やかに使用すること。
- ・溶解したワクチンは、雑菌混入や効力低下の恐れがあるので、再保存や再使用しないこと。
- ・溶解用液は「用法及び用量」に記載があるものを使用すること。
- ・注射器具は、滅菌又は煮沸消毒されたものを使用すること。薬剤により消毒した器具又は他の薬剤に使用した器具は使用しないこと。なお、乾熱、高圧蒸気滅菌又は煮

沸消毒等を行った場合は、室温まで冷えたものを使用すること。

- ・頸部皮下接種時に用いる注射針は20又は21ゲージを使用すること。また、投与時は汚染を避けるために、時々滅菌した注射針と取り替えること。
- ・本剤を投与する時には、接種室、衣服や手指の消毒など、衛生管理には十分注意すること。
- ・よく混ぜてから使用すること。また、ワクチンを均一にするため、時々振とうすること。

#### (専門的事項)

##### ① 相互作用

- ・野外には病原性の強いマレック病ウイルスが存在する。ワクチン投与による免疫成立前にこのようなウイルスの感染を受けると、ワクチン効果が十分に得られないことがある。ワクチン投与後は鶏の飼育管理に十分注意し、野外ウイルスの感染を避けること。

##### ② その他の注意

- ・本剤はシードロットシステムにより製造され、国家検定を受ける必要のないワクチンであるため、容器又は被包に「国家検定合格」と表示されていない。

#### 【その他の注意】

使用したワクチンの製造番号、有効期限、購入先、接種日時・場所、羽数、品種及び接種実施者等を記録しておくことと便利である。

#### 【包装】

凍結ワクチン (1アンプル 1mL 1,000ドーズ用)

凍結ワクチン (1アンプル 2mL 2,000ドーズ用)

#### 【製品情報等お問い合わせ先】

ワクチノーバ株式会社

ワクチン相談窓口

〒105-0013

東京都港区浜松町一丁目24番8号

Tel:03-6895-3710 Fax:03-6895-3711

製造販売元

・ japan ワクチノーバ株式会社

**va inova** 東京都港区浜松町一丁目24番8号

獣医師、薬剤師等の医療関係者は、本剤による副作用などによると疑われる疾病、障害若しくは死亡の発生又は本剤の使用によるものと疑われる感染症の発生に関する事項を知った場合において、保健衛生上の危害の発生又は拡大を防止するため必要があると認めるときは、上記【製品情報等お問い合わせ先】に連絡するとともに、農林水産省動物医薬品検査所 (<https://www.maff.go.jp/nval/iyakutou/fukusayo/sousa/index.html>) にも報告をお願いします。

↓最新の注意事項等情報はこちらよりご覧いただけます。



(以下余白)