



ブルモチル® プレミックス-50

【本質の説明】
本剤の有効成分であるチルミコシンは、エランコアニマルヘルス社(米国)によって発見されたマクロライド系の抗生物質で、マイコプラズマ及びグラム陰性のパストレラやアクチノバチルスなどに抗菌力を示します。

【成分及び分量】

本品 1kg 中チルミコシンリン酸塩をチルミコシンとして 50g (力価) 含有する。

- 注意－獣医師等の処方箋・指示により使用すること
注意－使用基準の定めるところにより使用すること

製造販売元

エランコジャパン株式会社
〒107-0052 東京都港区赤坂四丁目15番1号
<http://www.elanco.co.jp>



ブルモチル、Elanco 及び : エランコ又はその関連会社の商標です。

BG403276X

J4

プルモチル® プレミックス-50

▶ 使用前に本説明書を必ず読み、記載事項を守って使用してください。

【効能又は効果】

有効菌種 *Actinobacillus pleuropneumoniae*, *Mycoplasma hyopneumoniae*, *Pasteurella multocida*
適応症 豚:肺炎

【用法及び用量】

飼料 1 t 当たりチルミコシンとして下記の量を均一に混ぜて7日間経口投与する。
豚：50～200g（力価）

(添加量換算表)

| 飼料1t当たり チルミコシンとしての量 | プルモチルプレミックス-50 | |
|------------------------|----------------|------------|
| | 添加率 | 飼料1t当たり添加量 |
| 50g (力価) | 0.10% | 1.0kg |
| 100g (力価) | 0.20% | 2.0kg |
| 200g (力価) | 0.40% | 4.0kg |

(基本的事項)

使用上の注意

1. 守らなければならないこと
(一般的注意)
- ・本剤は効能・効果において定められた適応症の治療にのみ使用すること。
 - ・本剤は定められた用法・用量を厳守すること。なお、用法・用量に定められた期間以内の投与であっても、それを反復する投与は避けること。
 - ・本剤の使用に当たっては、治療上必要な最小限の期間の投与に止めること。
 - ・本剤は、要指示医薬品であるので獣医師等の処方せん・指示により使用すること。
 - ・本剤は、「使用基準」の定めるところにより使用すること。

注意：本剤は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第83条の4の規定に基づき上記の用法及び用量を含めて使用者が遵守すべき基準が定められた動物用医薬品ですので、使用対象動物〔豚〕について上記の用法及び用量並びに次の使用禁止期間を遵守して下さい。

豚：食用に供するために殺する前4日間

- (使用者に対する注意)
- ・作業時には、防護メガネ、マスク、手袋等の防護具を着用し、眼、鼻、口等に入らないよう、また、皮膚に付着しないよう注意すること。
 - ・取扱い後、顔や手を石鹼と水で洗うこと。

- (取扱い及び廃棄のための注意)
- ・開封後、使用残が生じた場合は袋の口を折り曲げて保管し、すみやかに使用すること。
 - ・使用済みの容器は地方公共団体条例等に従い処分すること。
 - ・期限を過ぎたものは使用しないこと。
 - ・本剤を廃棄する際は、環境や水系を汚染しないように注意し、地方公共団体条例等に従い処分すること。
 - ・小児の手の届かないところに保管すること。
 - ・食品と区別して保管すること。
 - ・本剤の保管は直射日光、高温及び多湿を避けること。
 - ・誤用を避け、品質を保持するため、他の容器に入れかえないこと。

2. 使用に際して気を付けること
(使用者に対する注意)
- ・誤って薬剤を飲み込んだ場合は、直ちに医師の診察を受けること。
 - ・万一眼に入った場合には、直ちに水でよく洗うこと。万一刺激が持続するようであれば、医師に相談すること。

- (豚に関する注意)
- ・副作用が認められた場合には、速やかに獣医師の診察を受けること。

(專門的事項)

- ①重要な基本的注意
- ・薬剤摂取に支障のある食欲低下の認められる豚では十分な効果が期待できないため、なるべく早期に治療すること。
 - ・本剤の使用に当たっては、耐性菌の発現等を防ぐため、原則として感受性を確認し、適応症の治療上必要な最小限の期間の投与に止めること。

【藥理學的情報等】

(藥物動態)

チルミコシンは吸収性が高く、呼吸器組織やその他の粘膜や分泌物などpHの低い組織への移行性に優れ、さらには好中球やマクロファージなどの免疫担当細胞に高濃度に移行する。

(抗菌作用)

チルミコシンは感受性菌のタンパク合成を阻害することにより、豚の肺炎起因菌であるバクテリヤやアクチノバクテリヤ、マイコプラズマに作用する。

包装

20kg (袋入り)

(有効期間) 24ヵ月

【製品情報お問い合わせ先】

エランコジャパン株式会社 製品お問い合わせ窓口

〒107-0052 東京都港区赤坂四丁目15番1号 TEL 0120-418-564

月～金／9時～12時、13時～17時（祝祭日及び弊社休業日を除く）

獣医師、薬剤師等の医薬関係者は、本剤による副作用などによると疑われる疾病、障害若しくは死亡の発生又は本剤の使用によるものと疑われる感染症の発生に関する事項を知った場合において、保健衛生上の危害の発生又は拡大を防止するため必要であると考えるときは、上記「製品情報お問い合わせ先」に連絡するとともに、農林水産省動物医薬品検査所 (<http://www.maff.go.jp/nval/yakutoku/fukusayo/sousa/index.html>) に報告をお願いします。

[illegible]