

動物用医薬品

寄生虫駆除剤 馬用
劇薬 指定医薬品 使用基準

承認指令書番号	4動薬第2342号
販売開始	2007年10月
再審査結果	2014年11月



エクイマックス®

EQUIMAX®

【成分及び分量】

品名	エクイマックス	
有効成分	イベルメクチン	ブラジリアンテル
含量	1g中 18.7mg	1g中 140.3mg

【効能又は効果】

馬：大円虫、小円虫、馬回虫及び糸虫の駆除

【用法及び用量】

1回体重1kg当たり下記の量を強制的に経口投与する。

馬：10.7mg（イベルメクチンとして200 μ g及び
ブラジリアンテルとして1.5mg）

【使用上の注意】

（基本的事項）

1. 守らなければならないこと

（一般の注意）

- ・ 本剤は、効能・効果において定められた目的のみに使用すること。
- ・ 本剤は、定められた用法・用量を厳守すること。
- ・ 本剤は、獣医師の指導の下で使用すること。
- ・ 本剤は、「使用基準」の定めるところにより使用すること。

注意：本剤は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第83条の4の規定に基づき上記の用法及び用量を含めて使用者が遵守すべき基準が定められた動物用医薬品ですので、使用対象動物（馬）について上記の用法及び用量並びに次の使用禁止期間を遵守して下さい。

馬：食用に供するためにと殺する前35日間。

（馬に関する注意）

- ・ 8週齢未満の馬には適用しないこと。

（取扱い及び廃棄のための注意）

- ・ 本剤は、劇薬であるので、取扱いには十分に注意し、他の医薬品、食品、飼料等と区別し、小児の手の届かないところに保管すること。
- ・ 本剤の保管は直射日光、高温及び多湿を避けること。
- ・ 使い残りの薬剤は使用しないこと。
- ・ 本剤は魚及びある種の水棲生物に影響を与えることがあるので、容器及び残りの薬剤は、地方公共団体条例等に従い処分すること。

2. 使用に際して気を付けること

（使用者に対する注意）

- ・ 誤って薬剤を飲み込んだ場合は、本剤のパッケージを提示し、直ちに医師の診察を受けること。
- ・ 使用後は手を洗うこと。
- ・ 目に入らないように注意すること。万一目に入った場合は水洗いすること。目に刺激を感じた場合は医師の診察を受けること。

（馬に関する注意）

- ・ 副作用が認められた場合には、速やかに獣医師の診察を受けること。

（専門的事項）

1. 副作用

- ・ 本剤の投与により、下記の場合、ときに下痢及び腹痛を起こすことがある。
 - ・ 下痢を起こしやすい馬
 - ・ 線虫または糸虫に極めて重度に感染している馬

【使用方法】

(1) 本剤の使用法は、以下のとおりである。

本剤はピストンに付した目盛りにより、体重50kgごとに必要量を投与することができる。最小投与体重は100kgである。リングを1/4回転してゆるめ、スライドさせてリングのシリンジに近い側を投与馬の体重に相当する目盛りに合わせ、1/4逆回転して固定する。馬の口中に飼料がないことを確認し、キャップを取り、容器を歯と歯の間（切歯と前臼歯の間）から挿入し、舌の裏にペーストを押し出す。投与後直ちに馬の頭を数秒間持ち上げ、確実に投与する。

(2) 本剤投与時に投与馬の体重が50kgの倍数にならない場合には、イベルメクチンとして体重1kg当たり200 μ g、ブラジリアンテルとして体重1kg当たり1.5mgを超えないように適宜投与量を調節すること。

【包装】エクイマックス 7.49g（ポリエチレン製シリンジ入）

【使用期限】外箱に記載

【製品情報お問い合わせ先】

株式会社ビルバックジャパン

〒541-0047 大阪市中央区淡路町1-3-14

TEL.0120-550-700

製造：SOFARIMEX

製造販売業者：株式会社ビルバックジャパン

〒541-0047 大阪市中央区淡路町1-3-14